

CONTROLES BÁSICOS TERRESTRE*



CONTROLES TERRESTRES

Alavanca Esquerda	Mover
Alavanca Direita R	Mover Câmera
Botão Direcional	Trocar de Arma
Botão A	Saltar / Flutuar
Botão B	Pegar Arma / Ataque Corporal / Entrar em Torre / Veículo / Sair da Flutuação
Botão X	Proteger-se
Botão Y	Decolar
Botão RT	Disparar Arma
Botão LT	Mirar com a Arma
Botão LB	Lançar Granada
Botão RB	Recarregar
Botão BACK	Ver Indicador de Objetivo
Botão START	Menu de Pausa

CONTROLES DE PROTEÇÃO

Alavanca Esquerda	Mover-se por entre Proteções
Alavanca Esq. + X	Pular de traz da Proteção
Botão RT	Tiro às Cegas
Botão LT	Mirar por sobre a Proteção
Botão X	Sair da Proteção
Botão X	Cair / Pular para Borda

CONTROLES DE VOO

Alavanca Esquerda	Manobrar
Alavanca Direita	Rolar
Botão Direcional	Olhar ao Redor
Botão A	Pairar no Ar
Botão B	Entrar em Torre / Aeronave
Botão X	Freios
Botão Y	Impulso
Botão RT	Disparar Arma
Botão LT	Tiro Secundário
Botão LB	Travar Mira
Botão RB	Câmera Livre de Voo
Botão BACK	Ver Marcador de Rota
Botão START	Menu de Pausa

AÇÕES ESPECIAIS

Clique e Mantenha Ambas as Alavancas Esquerda e Direita Movendo-as para a Esq. e para a Direita	Tonneau "Parafuso"
Clique com o Botão e Mova a Alavanca Esq. e Direita para Cima e para Baixo	Reversão Vertical
Clique e Mova a Alavanca Esq. para Baixo e a Alavanca Direita para Cima	Reversão com impulso

*Para mais detalhes sobre as demais possibilidades de comandos, consulte o manual original (inglês) do game incluso no produto.

Advertências de Saúde Importantes sobre Videogames

Ataques da Epilepsia Fotossensível

Uma pequena porcentagem da população pode apresentar convulsões quando exposta a certas imagens visuais, incluindo flashes de luz ou padrões que podem surgir em videogames. Mesmo pessoas sem nenhum histórico de convulsões ou ataques epiléticos podem ser portadoras de uma condição ainda não diagnosticada que pode provocar as "convulsões da epilepsia fotossensível" durante a exposição a videogames. Esses ataques podem ter uma variedade de sintomas, incluindo vertigem, visão alterada, espasmos oculares ou nos músculos da face, movimentos abruptos ou tremor em braços e pernas, desorientação, confusão ou perda momentânea de consciência. Os ataques também podem causar perda de consciência ou convulsões que podem provocar ferimentos decorrentes de queda

ou choque com objetos próximos. Se você apresentar qualquer um desses sintomas, pare de jogar imediatamente e consulte um médico. Os pais devem ficar atentos ou perguntar às crianças sobre os sintomas acima – crianças e adolescentes são mais suscetíveis do que adultos a esses ataques. O risco de ataques da epilepsia fotossensível pode ser reduzido se as seguintes precauções forem tomadas: Sentar-se mais longe da tela, usar uma tela menor, jogar em um aposento bem iluminado e não jogar quando sentir sono ou cansaço. Se você ou qualquer pessoa da sua família tiver um histórico de ataques convulsivos ou epilepsia, consulte um médico antes de jogar.