

## CONTROLES BÁSICOS\*



**CONTROLADOR XBOX 360**

	MENU DE CONTROLES	MENU DE AÇÃO
Alavanca esquerda L / Botão Direcional	<ul style="list-style-type: none"> <li>⬆️⬇️ Destacar Item do Menu</li> <li>⬆️⬇️ Mudar Opção</li> </ul>	Mover / Virar / Inclinar para Frente/Traz
Alavanca Direita R		⬆️ Virar
Botão A		Saída da Plataforma Inicial/Rampa / Definir Direção do Vento / Aterrissagem / Iniciar / Aumentar Velocidade / Disparar / Recuperar / Remar / Saltar
Botão B	Cancelar / Sair do Menu / Mudar Câmera	Mover / + LT/RT Virar / Virar / Inclinar para Frente/Traz
Botão X	Ver Ranking de Pontos / Cancelar / Sair do Menu	
Botão Y	Ver Informações no Game Card	
Botão BACK	Alternar para o Modo de Prática (na Tela de Carregamento)	
Botão START	Selecionar Item no Menu	Menu do Jogo
LB / RB	Alternar Item no Menu	
LT	Destacar Item do Menu	Equilíbrio no Ar / Agachar / Preparar Saída / Inclinar para Direita / Virar para Direita
RT	Destacar Item do Menu	Equilíbrio no Ar / Agachar / Preparar Saída / Inclinar para Direita / Virar para Direita

\*Para mais detalhes sobre as demais possibilidades de comandos. Consulte o Manual original (inglês) do Game incluso no produto.

### Advertências de Saúde Importantes sobre Videogames

#### Ataques da Epilepsia Fotosensível

Uma pequena porcentagem da população pode apresentar convulsões quando exposta a certas imagens visuais, incluindo flashes de luz ou padrões que podem surgir em videogames. Mesmo pessoas sem nenhum histórico de convulsões ou ataques epiléticos podem ser portadoras de uma condição ainda não diagnosticada que pode provocar as "convulsões da epilepsia fotosensível" durante a exposição a videogames. Esses ataques podem ter uma variedade de sintomas, incluindo vertigem, visão alterada, espasmos oculares ou nos músculos da face, movimentos abruptos ou tremor em braços e pernas, desorientação, confusão ou perda momentânea de consciência. Os ataques também podem causar perda de consciência ou convulsões que podem provocar ferimentos decorrentes de queda

ou choque com objetos próximos. Se você apresentar qualquer um desses sintomas, pare de jogar imediatamente e consulte um médico. Os pais devem ficar atentos ou perguntar às crianças sobre os sintomas acima – crianças e adolescentes são mais suscetíveis do que adultos a esses ataques. O risco de ataques da epilepsia fotosensível pode ser reduzido se as seguintes precauções forem tomadas: Sentar-se mais longe da tela, usar uma tela menor, jogar em um aposento bem iluminado e não jogar quando sentir sono ou cansaço. Se você ou qualquer pessoa da sua família tiver um histórico de ataques convulsivos ou epilepsia, consulte um médico antes de jogar.